

1 Decay Scheme

Te-127 undergoes beta decay to various nuclear levels of I-127 through five β^- and nine subsequent γ emissions.

Le tellure 127 se désintègre par émissions bêta moins vers des niveaux excités et, principalement, vers le niveau fondamental de l'iode 127.

2 Nuclear Data

$T_{1/2}({}^{127}\text{Te})$: 9,35 (10) h

$Q^{-}({}^{127}\text{Te})$: 702 (4) keV

2.1 β^- Transitions

	Energy keV	Probability × 100	Nature	lg <i>ft</i>
$\beta_{0,5}^-$	84 (4)	0,00013 (2)	allowed	8,38
$\beta_{0,4}^-$	284 (4)	1,19 (2)	allowed	6,086
$\beta_{0,3}^-$	327 (4)	0,0006 (3)	allowed	9,58
$\beta_{0,2}^-$	499 (4)	0,025 (3)	allowed	8,57
$\beta_{0,0}^-$	702 (4)	98,780 (14)	allowed	5,49

2.2 Gamma Transitions and Internal Conversion Coefficients

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α_K	α_L	α_M	α_T
$\gamma_{1,0}(\text{I})$	57,608 (11)	0,144 (3)	M1+0.7%E2	3,16 (5)	0,449 (8)	0,0910 (16)	3,72 (6)
$\gamma_{2,1}(\text{I})$	145,252 (14)	0,0059 (9)	E2	0,357 (5)	0,0907 (13)	0,0189 (3)	0,471 (7)
$\gamma_{3,2}(\text{I})$	172,132 (12)	0,00035 (23)	M1+0.7%E2	0,1419 (20)	0,0185 (3)	0,00373 (6)	0,1650 (24)
$\gamma_{2,0}(\text{I})$	202,860 (8)	0,062 (2)	M1+21%E2	0,0965 (17)	0,0142 (5)	0,00289 (10)	0,1143 (22)
$\gamma_{4,2}(\text{I})$	215,13 (6)	0,043 (2)	M1+4,0%E2	0,0782 (11)	0,01031 (16)	0,00208 (4)	0,0910 (13)

	Energy keV	P _{γ+ce} × 100	Multipolarity	α _K	α _L	α _M	α _T
γ _{4,1} (I)	360,38 (6)	0,139 (2)	M1+3,6%E2	0,0201 (3)	0,00256 (4)	0,000514 (8)	0,0232 (4)
γ _{3,0} (I)	374,992 (9)	0,0003 (2)	E2	0,01671 (24)	0,00257 (4)	0,000524 (8)	0,0199 (3)
γ _{4,0} (I)	417,99 (6)	1,013 (11)	M1+0,6%E2	0,01381 (20)	0,001741 (25)	0,000350 (5)	0,01598 (23)
γ _{5,0} (I)	618,31 (13)	0,00013 (2)	M1+50%E2	0,0047 (4)	0,00061 (3)	0,000123 (6)	0,0055 (4)

3 Atomic Data

3.1 I

ω _K	:	0,882	(4)
ω̄ _L	:	0,092	(4)
n _{KL}	:	0,909	(4)

3.1.1 X Radiations

		Energy keV		Relative probability	
X _K	Kα ₂	28,3175		53,8	
	Kα ₁	28,6123		100	
	Kβ ₃	32,2397	}	28,7	
	Kβ ₁	32,2951			}
	Kβ ₅ ''	32,539			}
	Kβ ₅ '	32,55	}		
	Kβ ₂	33,042	}	6,52	
	Kβ ₄	33,12	}		
	KO _{2,3}	33,166	}		
X _L	Lℓ	3,485			
	Lα	3,927 – 3,938			
	Lη	3,779			
	Lβ	4,221 – 4,508			
	Lγ	4,801 – 5,060			

3.1.2 Auger Electrons

	Energy keV	Relative probability
Auger K		
KLL	22,659 – 23,909	100
KLX	26,853 – 28,609	45,9
KXY	31,02 – 33,16	5,28
Auger L	2,38 – 3,88	1223

4 Electron Emissions

		Energy keV	Electrons per 100 disint.
e _{AL}	(I)	2,38 - 3,88	0,1174 (18)
e _{AK}	(I)		0,0145 (6)
	KLL	22,659 - 23,909	}
	KLX	26,853 - 28,609	}
	KXY	31,02 - 33,16	}
$\beta_{0,5}^-$	max:	84 (4)	0,00013 (2)
$\beta_{0,5}^-$	avg:	21,8 (11)	
$\beta_{0,4}^-$	max:	284 (4)	1,19 (2)
$\beta_{0,4}^-$	avg:	80,7 (13)	
$\beta_{0,3}^-$	max:	327 (4)	0,0006 (3)
$\beta_{0,3}^-$	avg:	94,5 (13)	
$\beta_{0,2}^-$	max:	499 (4)	0,025 (3)
$\beta_{0,2}^-$	avg:	153,0 (15)	
$\beta_{0,0}^-$	max:	702 (4)	98,780 (14)
$\beta_{0,0}^-$	avg:	227,8 (16)	

5 Photon Emissions

5.1 X-Ray Emissions

		Energy keV	Photons per 100 disint.
XL	(I)	3,485 — 5,060	0,0119 (6)
XK α_2	(I)	28,3175	0,0309 (7)
XK α_1	(I)	28,6123	0,0574 (12)
XK β_3	(I)	32,2397	}
XK β_1	(I)	32,2951	}
XK β_5''	(I)	32,539	}
XK β_5'	(I)	32,55	}
XK β_2	(I)	33,042	}
XK β_4	(I)	33,12	}
XKO _{2,3}	(I)	33,166	}

5.2 Gamma Emissions

	Energy keV	Photons per 100 disint.
$\gamma_{1,0}(\text{I})$	57,608 (11)	0,0306 (6)
$\gamma_{2,1}(\text{I})$	145,252 (14)	0,0040 (6)
$\gamma_{3,2}(\text{I})$	172,132 (12)	0,0003 (2)
$\gamma_{2,0}(\text{I})$	202,860 (8)	0,056 (2)
$\gamma_{4,2}(\text{I})$	215,13 (6)	0,039 (2)
$\gamma_{4,1}(\text{I})$	360,38 (6)	0,136 (2)
$\gamma_{3,0}(\text{I})$	374,991 (9)	0,0003 (2)
$\gamma_{4,0}(\text{I})$	417,99 (6)	0,997 (11)
$\gamma_{5,0}(\text{I})$	618,31 (13)	0,00013 (2)

6 Main Production Modes

Te – 126(n, γ)Te – 127

Te – 128(n,2n)Te – 127

U – 235(n,f)Sb – 127

Sb – 127(β^-)Te – 127

7 References

- G.T.SEABORG, J.J.LIVINGOOD, J.W.KENNEDY. Phys. Rev. 57 (1940) 363
(Half-life)
- J.D.KNIGHT, J.P.MIZE, J.W.STARNER, J.W.BARNES. Phys. Rev. 102 (1956) 1592
(Half-life, Gamma-ray energies, Gamma-ray emission probabilities)
- N.K. MAJUMDAR, A.CHATTERJEE. Nucl. Phys. 41 (1963) 192
(Half-life)
- R.L.AUBLE, W.H.KELLY. Nucl. Phys. 73 (1965) 25
(Gamma-ray energies, Gamma-ray emission probabilities)
- J.F.NEESON, J.P.ROALSVIG, R.G.ARNS. Can. J. Phys. 44 (1966) 1313
(Gamma-gamma coincidence)
- J.S.GEIGER. Phys. Rev. 158 (1967) 1094
(Multipolarity, ICC)
- S.M.QAIM, M.EJAZ. J. Inorg. Nucl. Chem. 30 (1968) 2577
(Half-life)
- K.E.APT, W.B.WALTERS, G.E.GORDON. Nucl. Phys. A152 (1970) 344
(Gamma-ray energies, Gamma-ray emission probabilities)
- M.BORMANN, H.H.BISSEM, E.MAGIERA, R.WARNEMUNDE. Nucl. Phys. A157 (1970) 481
(Half-life)
- F.P.LARKINS. At. Data Nucl. Data Tables 20 (1977) 311
(Auger energies, Conversion-electron energies)
- R.J.GEHRKE, R.G.HELME. Int. J. Appl. Radiat. Isot. 28 (1977) 744
(Gamma-ray energies)
- K.S.KRANE. At. Data Nucl. Data Tables 19 (1977) 363
(Mixing ratios)
- K.S.KRANE. At. Data Nucl. Data Tables 25 (1980) 29
(Mixing ratios)
- E.SCHÖNFELD, H.JANSSEN. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A369 (1996) 527
(X(K), X(L), Auger electrons)

- E.SCHÖNFELD, G.RODLOFF. PTB Report-6.11-98-1 (1998)
(Auger electrons)
- E.SCHÖNFELD, G.RODLOFF. PRB Report-6.11-1999-1 (1999)
(X(K))
- I.M.BAND, M.B.TRZHASKOVSKAYA, C.W.NESTOR JR., P.O.TIKKANEN, S.RAMAN. At. Data Nucl. Data Tables 81 (2002) 1
(Theoretical ICC)
- S.RAMAN, C.W.NESTOR JR., A.ICHIHARA, M.B.TRZHASKOVSKAYA. Phys. Rev. C66 (2002) 044312
(Theoretical ICC)
- G.AUDI, A.H.WAPSTRA, C.THIBAUT. Nucl. Phys. A729 (2003) 337
(Q)
- R.D.DESLATTES, E.G.KESSLER JR., P.INDELICATO, L. DE BILLY, E. LINDROTH, J. ANTON. Rev. Mod. Phys. 75 (2003) 35
(X-ray energies)
- T.KIBEDI, T.W.BURROWS, M.B.TRZHASKOVSKAYA, P.M.DAVIDSON, C.W.NESTOR JR. Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A589 (2008) 202
(Theoretical ICC)
- A.HASHIZUME. Nucl. Data Sheets 112 (2011) 1647
(Nuclear levels)
- G.AUDI, M.WANG. Private communication, Atomic mass evaluation, CSNSM (2011)
(Q)

